



Utilizare corticosteroizi topici



Societatea Română de
Alergologie și
Imunologie Clinică



Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune



Asociația Română pentru
Promovarea Sănătății



ASOCIAȚIA ROMÂNĂ
de IMUNO-DERMATOLOGIE



Utilizare corticosteroizi topici












Corticosteroizii topici sunt adesea prescriși pentru dermatita atopică în faza acută a bolii. Aceștia ajută la reducerea eritemului și a inflamației, facilitând vindecarea pielii. Este important să folosiți corticosteroizii așa cum au fost prescriși de către medic pentru a reduce riscul efectelor adverse.

Ce trebuie să știu când folosesc corticosteroizi topici?

- Folosiți corticosteroizii doar cum v-a fost indicat de către medic.
- Aplicați corticosteroizii doar pe zonele afectate ale pielii.
- Nu aplicați corticosteroizii pe zonele sensibile cum ar fi pleoapele și zona genitală.
- Odată ce inflamația este controlată, reduceți sau opriți folosirea corticosteroizilor la indicația medicului.
- Evitați folosirea corticosteroizilor pe o perioadă îndelungată.

Cât este de ajuns?

O unitate de vârf de deget () - cantitatea de cremă sau unguent, stoarsă din tub, de la vârful indexului unui adult până la primul pliu al degetului.

	Față și gât	Braț și mână	Picior și talpă	Torace și abdomen	Spate și zonă fesieră
3-12 luni					
1-3 ani					
3-6 ani					
6-10 ani					
>10 ani si adulți					



Societatea Română de
**Alergologie și
Imunologie Clinică**



APAA
Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune



arps
Asociația Română pentru
Promovarea Sănătății



ASOCIAȚIA ROMÂNĂ
de IMUNO-DERMATOLOGIE